

MANEJO DE GESTANTES E PUÉRPERAS COM SRAG POR COVID19

CONCENTRAÇÃO DE O2 GERADA POR DISPOSITIVO	
Oferta O2	FiO2
Ar Ambiente	0,21
CNO2 1L/min	0,24
CNO2 2 L/min	0,28
CNO2 3 L/min	0,32
CNO2 4 L/min	0,36
CNO2 5 L/min	0,40
MNR 6 L/min	0,60
MNR 7 L/min	0,70
MNR 8 L/min	0,80
MNR 9-10 L/min	0,80-0,90
MNR 11-15 L/min	0,90

A PaO₂ ESPERADA (fisiológica) PARA UMA GESTANTE É EM TORNO DE 100mmHg

Índice de oxigenação= PaO₂/FiO₂

GESTANTE COM SRAG:

- IDADE GESTACIONAL
- PADRÃO RESPIRATÓRIO
- GASOMETRIA

IG > QUE 34 SEMANAS:

- INTERROMPER

IG < QUE 24 SEMANAS:

- CONDUTA CLÍNICA
- INDEPENDENTE DA GESTAÇÃO

IG ENTRE <34 E> 24 SEMANAS

- AVALIAR PADRÃO RESPIRATÓRIO
- GASOMETRIA
- CORTICOTERAPIA PARA MATURAÇÃO PULMONAR FETAL

SINAIS DE ALERTA

- FR \geq 30irm
- SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO (fala entrecortada, batimento de asa de nariz, retração de fúrcula esternal e/ou intercostal e cianose).
- SATURAÇÃO <95%

CONDUTA

- ⇒ OTIMIZAR oferta de oxigênio → Cateter até 6 l/min → Máscara não reinalante
- ⇒ METAS: saturação \geq 95% e PAO₂ entre 80 e 90 mmHg
- ⇒ MANTER monitorização rigorosa para garantir que essas metas sejam atingidas
- ⇒ COMUNICAR toda equipe sobre o caso e deixar o anestesista de sobreaviso para intubação
- ⇒ DISCUTIR interrupção, se existir dúvida, com a equipe: Leila Katz/ Brena Melo/ Liana Lira/ Judith Rêgo /Gabriela Melo /Gláucia Guerra – ESTAMOS SEMPRE DISPONÍVEIS PARA AJUDAR
- ⇒ REAVALIAR a cada 1 hora os sinais de alerta, se optado por conduta expectante
- ⇒ PACIENTES que necessitam de aumento progressivo de oxigênio, chegando a máscara não reinalante, SEM MELHORA CLÍNICA:

INTUBAR → INTERROMPER → TRANSFERIR PARA UTI

ATENÇÃO

- NUNCA TRANSFERIR PACIENTES DE UM SETOR PARA O OUTRO EM INSUFICIÊNCIA VENTILATÓRIA.
- ESTABILIZAR E GARANTIR VIA AÉREA ANTES DE TRANSFERIR
- GESTANTES TEM MENOR RESERVA VENTILATÓRIA E SÃO PACIENTES COM INTUBAÇÃO DIFÍCIL
- PACIENTES NA ENFERMARIA EM USO DE O2 NA ENFERMARIA DEVEM SER EVOLUIDAS PELO PLANTÃO MÉDICO NOTURNO
- PACIENTES EM O2 E COM SINAIS DE ALERTA DEVEM SER TRANSFERIDAS PARA O PRÉ-PARTO

PUÉRPERAS COM SRAG

- SEGUIR PROTOCOLO DE PACIENTES CLÍNICOS COM CUIDADOS DE PUERPÉRIO
- LEMBRAR QUE TAMBÉM SÃO PACIENTES COM INTUBAÇÃO DIFÍCIL